

Fé como fator de proteção para ideação suicida em pacientes soropositivos

Julio Cesar Tolentino Junior, Caroline Fernanda dos Santos Tiago, Marcos Pereira Cardozo, Felipe Tavares Rodrigues, Ana Lucia Taboada Gjorup

INTRODUÇÃO

O suicídio é uma das principais causas de morte, especialmente em pacientes HIV positivos. A espiritualidade tem sido considerada um fator de proteção. Com isso, é possível que a fé, como uma das dimensões da espiritualidade, seja um preditor de menor ideação suicida (IS) em pacientes soropositivos.

OBJETIVOS

Investigar a relação entre fé e IS em pessoas vivendo com HIV acompanhadas no ambulatório do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle.

MÉTODOS

Estudo transversal, com inclusão de pessoas vivendo com HIV em acompanhamento ambulatorial no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Foram aplicados questionários sócio-demográficos; Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) e o *Functional Assessment of Chronic Illness Therapy -Spiritual Well -Being* -FACIT-Sp-12 (pontuação total e avaliação da dimensão “fé”). Aplicou-se teste t, correlação linear de Pearson e análise de regressão, considerando-se nível de significância de 5%, através do SPSS 21®




Figura 1: Esquema ilustrativo da metodologia realizada durante a pesquisa.

RESULTADOS

Foram incluídos 42 pacientes (n=35 homens), com idade de $45,6 \pm 6,8$ anos. Destes, 81,2% relataram afiliação religiosa (Figura 1). Foram encontrados valores significativamente menores na pontuação total do FACIT-Sp-12 nos pacientes com IS em comparação com aqueles sem ideação ($42,5 \pm 7,2$ pontos e $27,2 \pm 13,9$ pontos, respectivamente; $p=0,01$). O escore da dimensão fé do FACIT-Sp-12 também foi significativamente menor naqueles com IS ($13,5 \pm 3,1$ pontos e $8,5 \pm 5,9$ pontos, respectivamente; $p=0,004$)- Figura 1

RESULTADOS

Na análise de regressão linear, em que a variável dependente foi a pontuação total do BSI, houve relação com as seguintes variáveis preditoras: pontuação total do FACIT-Sp-12 ($r^2=0,30$; $F=-4,18$; $p<0,001$) e escore de fé ($r^2=0,18$; $F=-3,1$; $p=0,005$)- Figura 3. Controlando idade e sexo, foi encontrada correlação negativa entre IS e as variáveis FACIT-Sp-12 total ($R=-0,50$; $p=0,001$) e fé ($R=-0,47$; $p=0,002$). Na análise de regressão múltipla, IS não foi explicado pelo sexo, estado civil, trabalho, escolaridade, orientação sexual e uso de TARV.



Figura 2: Gráfico que demonstra a porcentagem de afiliação religiosa entre os pacientes entrevistados.




Figura 2: Gráfico ilustrando os valores significativamente maiores do escore de fé em pacientes HIV positivos sem ideação suicida




Figura 3: Gráfico de dispersão demonstrando relação linear inversa entre o escore de fé e a pontuação da Escala de Ideação Suicida de Beck

CONCLUSÃO

A quantificação da fé, através do FACIT-Sp-12, foi preditora de IS em pacientes soropositivos.

Estes resultados sugerem que a fé seja um possível fator de proteção para ideação suicida nesta população.